


ដំបិតកម្មដំណាំត្រីបែកសំរាប់កសិករ



រៀបចំដោយមានការចូលរួមពីអង្គការ សន្តិសេនា សមាគមមនុស្សចាស់

ពោធិធំ អង្គការចិត្តធម៌ និង អង្គការ ស៊ី អារ អែស កម្មវិធីកសិកម្ម

ដក់ស្រង់ពីឯកសារឈើហូបផ្លែរបស់អង្គការ ប៉ាដិក ស៊ីដេសេ និង សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប

មាតិកា


	ទំព័រ
១- សេចក្តីផ្តើម.....	០១
២- ការជ្រើសរើសពូជ.....	០២
៣- ការបណ្តុះកូន	០២
ក. ជ្រើសរើសទីតាំងថ្នាល.....	០២
ខ. ការរៀបចំថ្នាល.....	០២
គ. ការបណ្តុះកូនត្របែក.....	០៣
ឃ. ការផ្សាំក្នុងថង់.....	០៤
៤- ការដាំដុះ.....	០៥
ក. ការជ្រើសរើសទឹកន្លែងដាំដុះ.....	០៥
ខ. របៀបដឹករណ្តៅ.....	០៥
គ. ការដាក់ដីក្នុងរណ្តៅ.....	០៦
ឃ. ការដាំកូនត្របែក.....	០៧
៥- ការថែទាំ.....	០៧
ក. ការដាក់ដីបំប៉ន.....	០៧
ខ. ការស្រោចទឹក.....	០៨
គ. ការតាក់តែងមែក.....	០៨
ឃ. ការការពារជម្ងឺ និង សត្វល្អិតចង្រៃ.....	១០
៦- ការប្រមូលផល.....	១០
៧- ការបន្តពូជ.....	១០
ក. ការបន្តពូជដោយគ្រាប់.....	១០
ខ. ការបន្តដោយសាកមែក.....	១០

១-សេចក្តីផ្តើម

ត្របែកគឺជារុក្ខជាតិមួយដែលកសិករភាគច្រើននិយមដាំ ព្រោះអាចដុះលូតលាស់ បានលឿនលឿរតែគ្រប់ប្រភេទ។ វាមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដូចជា ហូបផ្លែស្រស់ជាបង្កែម ជ្រក់ ដើមធ្វើជាសំភារៈសង្ហារឹមផ្សេងៗ ជាបាងខ្យល់ ជាម្ហូប និង ស្លឹកជាដី ។

២-ការជ្រើសរើសពូជ

ពូជត្របែកដែលអាចយកមកដាំបាននោះគឺ ពូជធ្លាប់ផ្លែ ធនជំងឺ ផ្លែធំ សាច់ក្រាស់ រស់ជាតិឆ្ងាញ់ មានប្រភពច្បាស់លាស់ និង តម្រូវការសំរាប់ទីផ្សារខ្ពស់ ។




៣-ការបណ្តុះកូន

ក. ជ្រើសរើសទីតាំងថ្នាល:

ទីតាំង និង ការរៀបចំថ្នាលជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់សំរាប់ធ្វើអោយការដុះពន្លកនៃកូន ដំណាំបានគង់វង់ក្នុងបរិមាណខ្ពស់ និង សុខភាពល្អនោះដូចជា៖- ក្បែរប្រភពទឹកដ៏ទូលមិន លិចទឹក មានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ និង ជាទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ។

ខ. ការរៀបចំថ្នាល:

ត្រូវលើកដីថ្នាលអោយបានកំពស់ពីរតិក ទទឹងមួយម៉ែត្រ និង បណ្តោយអាស្រ័យ ទៅតាមប្រវែងជាក់ស្តែងដែលចង់បាន កាប់ដីអោយម៉ត់ ហាលរយៈពេលពីរ ទៅ បីសប្តាហ៍ ដើម្បីសំលាប់បាក់តេរី ឬ សត្វល្អិតចង្រៃផ្សេងៗ និង ជ្រោយដីរួចជ្រើសយកស្មៅចេញ ។




គ.ការបណ្តុះកូនត្របែក:

ត្រូវលាងគ្រាប់ត្របែកនិងទឹកអោយបានស្អាតរួចហាល និង កំដៅថ្ងៃ ពីពីរ ទៅ បីថ្ងៃ ពង្រាយគ្រាប់លើរងដែលបានរៀបចំជាស្រេចចំងាយប្រហែលកន្លះតិក ពីគ្រាប់មួយ ទៅគ្រាប់ មួយ លុបដីម៉ត់ពីលើគ្រាប់អោយបានជិតល្អ ក្របកំណាត់ចំបើងចិត្រូវខ្លីៗ ស្រោចទឹក អោយសើមជាប្រចាំ ។



ឃ. ការផ្សាំកូន :

កូនត្របែកត្រូវយកទៅផ្សាំក្នុងថង់បានលុះត្រាណាថង់ត្រូវច្រកដោយដឹកប៉ុស្តិ៍មួយភាគ
អង្កាមមួយភាគ និង ដីខ្សាច់មួយភាគជាស្រេច ហើយស្រោចទឹកភ្លាមដើម្បីអោយបួស ចាប់
ជាប់ ជាមួយដីថ្មីក្នុងថង់ ។




៤-ការដាំដុះ

ក.ការជ្រើសរើសទីកន្លែងដាំដុះ :

ត្រូវដាំត្របែកនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព ដីខ្ពស់ដែលមិនលិចទឹក មានជីជាតិល្អ ហើយមានសំណើមល្អ និង ឆ្ងាយពីដើមឈើធំៗដែលមានស្រាប់យ៉ាងហោចណាស់ ១០ម៉ែត្រ មានប្រភពទឹកនៅក្បែរងាយស្រួលក្នុងការស្រោចស្រពនៅពេលជួបប្រទះការរាំងស្ងួត ។


ខ.របៀបដឹករណ្តោះ

រណ្តោះដាំដែលទំហំសមល្មមគឺ ជំរៅប្រាំបីតិក បណ្តោយប្រាំបីតិក និង ទទឹងប្រាំបីតិក (ប្រាំបីតិកបួនជ្រុង) គំលាតពីរណ្តោះមួយទៅរណ្តោះមួយយ៉ាងហោចណាស់៦ម៉ែត្រ ហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកំណត់ជួរអោយប៉ះ និង ពន្លឺព្រះអាទិត្យស្មើគ្នា ។



គ. ការដាក់ជីក្នុងរណ្តៅ:

ក្រោយពេលដឹករណ្តៅរួច មុនពេលដាំត្រូវប្រមូលសំរាមដែលបានពីរុក្ខជាតិ ផេះ លាមកសត្វ ឬ ជីកំប៉ុស្តិ៍ដាក់ក្នុងរណ្តៅអោយបានច្រើនជាការប្រសើរព្រោះវាជាជីធម្មជាតិដែលផ្ទុកទៅដោយអាហារធាតុចិញ្ចឹមច្រើនយ៉ាង ។




ឃ.ការដាំកូនត្របែក:

ត្រូវពិនិត្យ និង អនុវត្តអោយបានហ្មត់ចត់ដូចជា :- កូនត្របែកត្រូវមាន អាយុយ៉ាងតិច មួយខែត្រូវជៀវថង់ថ្មមៗនិងកាំបិតមុតជៀវសវាងបែកដី ដាំនៅពេលរសៀល រួចស្រោចទឹក អោយបានសើមដើម្បីអោយដីថ្មី ចាស់ និង គល់កូនត្របែកចាប់ជាប់គ្នាហើយវាមាន លទ្ធភាពស្រូបសំណើមបាន ។

ង.ការថែទាំ

ក-ការដាក់ដីបំប៉ន:

ដីបំប៉នត្រូវដាក់ពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ គឺនៅរៀងរាល់ដើម និង ចុងរដូវវស្សា ដឹករណ្តៅ ពង្រីកដីក្នុងត្របែកដោយគិតចំងាយពីគល់ទៅទន្ទឹម និង ចុងមែកដែលបែកចេញទៅខាង វែងជាងគេជុំវិញដើមជំរៅកន្លះម៉ែត្រ ទំហំពីពីរ ទៅ បួនតិក ដាក់ធម្មជាតិ និង ជីគីមីសមាសដែលមានធាតុ អ៊ុន ប៊េ កា (ប៉ុន្តែមិនអាចដាក់តែជីគីមីសុទ្ធទេ) ។




ខ-ការស្រោចទឹក:


ស្រោចទឹកដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់រោមជញ្ជកបស់ឫសស្រូបយកអាហារ ធាតុស្រោចទឹកបំប៉នអោយបានទៀងទាត់នៅពេលកូនត្របែកនៅតូច ស្រោចទឹកបន្ថែមពេលណាដែលយើងសង្កេតឃើញថាដំណាំត្របែកខ្លះជាតិទឹកនៅពេលវាពេញវ័យ ស្រោចទឹកបំប៉នអោយបានច្រើនជាប្រចាំនៅមុន និង ក្នុងពេលដំណាំត្របែកចេញផ្កា ។

គ-ការតាក់តែងមែក:

ការតាក់តែងមែកគឺត្រូវធ្វើឡើងរៀងរាល់បួនឆ្នាំម្តង ក្រោយពេលប្រមូលផលរួចហើយមែកដែលត្រូវកាត់ចោលនោះមានដូចជា :- មែកចាស់ពេក(មិនផ្លែ) មែកមានចុងសំយុងចុះ មែកដុះចាក់ទៅក្នុង មែកមានជំងឺ មែកមានដុះរុក្ខជាតិបញ្ជើរក្អែក ។ ការធ្វើរបៀបនេះដើម្បីអោយសុខភាពមែកល្អ ទទួលបានផ្លែបានគ្រប់គ្រាន់ និង ស្រូបយកខ្យល់បានល្អធ្វើអោយត្របែកផ្លែធំ ។



មែកព័កលោត



មែកប្រុនតាកតែង

ឃ. ការការពារជម្ងឺ និង សត្វល្អិតចង្រៃ:

យើងមានវិធីច្រើនយ៉ាងដូចជា ដាក់កំបោរស សាចជូរខៀវ ស្ពាន់ធុរ ជុំវិញគល់
ការពារសត្វកន្ត្រៃ ប្រើថ្នាំគីមីពុលកសិកម្មមាំឡាចុងនៅពេលសត្វល្អិតបំផ្លាញផ្កា ឬ ក្តិប(រាល់
ពេលដែលប្រើថ្នាំពុលគីមីត្រូវដាក់ផ្លាកសញ្ញាសំគាល់ជៀសវាងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស និង
សត្វ) មែកដែលមានជម្ងឺត្រូវកាប់រួចយកទៅកប់ ឬ ដុតចោល និង បំពាក់ភ្លើងដើម្បីអោយ
ផ្សែងហុយបណ្តេញសត្វល្អិត ។

៧-ការបន្តពូជ

មានវិធីច្រើនយ៉ាងសំរាប់បន្តពូជត្របែក ប៉ុន្តែមានវិធីតែពីរទេដែលសមស្របសំរាប់
កសិករគឺមានដូចក្រោម ៖-

ក. ការបន្តពូជដោយគ្រាប់:

ការបន្តពូជដោយគ្រាប់គឺជាវិធីមួយដែលមានលក្ខណៈល្អ និង ងាយស្រួលជាង គេ
ការដាំដោយគ្រាប់គឺលូតលាស់បានល្អ មានប្រពន្ធិឫសមាំ ធនទ្រាំជម្ងឺ មានអាយុកាល លូតលាស់
រឹងប៉ុន្តែមានការចុះតូចនៃទំហំផ្លែពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ចំពោះពូជមួយចំនួន ។

ខ. ការបន្តដោយសាកមែក:

ការដាំត្របែកដោយមែកសាកឆាប់អោយផលគឺក្នុងរយៈពេលពីប្រាំមួយទៅ មួយ
ឆ្នាំក្រោយពេលដាំតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែវាមានអាយុខ្លីជាងការដាំដោយគ្រាប់ព្រោះការលូតលាស់
នៃឫស និង ដើមពុំមានតុល្យភាពគ្នា ។ ការសាកមែកត្រូវធ្វើតាមរបៀបដូចជា ជ្រើសរើស
មែកណាដែលមានសុខភាពល្អ ប្រវែងប្រហែលមួយម៉ែត្រ លាក់សំបកក្រឡឹងជុំវិញមែកដែល
មានប្រវែងស្មើ និង ទំហំនៃមែក បកសំបកចេញ កោសរំអិល រក្សាទុករយៈពេលប្រហែល១៥
ទៅ ៣០នាទី ចងថង់ផ្លាស់ស្លឹកដែលច្រកពេញដោយកំប៉ុស្តិ៍សើមជុំវិញមែកដែលកោសរួច ចង
ខ្សែរិតចំកណ្តាលអោយណែន ស្រោចទឹកអោយសើមជាប្រចាំ និង កាត់យកមែកដែលបានសាក

ច្រកក្នុងថង់ផ្សារនៅពេលដែលយើងសង្កេតឃើញថាបួសដែលដុះមានពណ៌ត្នោត ។

