

១-ការផែនទី :

ក-ការច្នៃប្រឌិត :

សំណួរកូរជាប្រភេទដំណាំដែលទាមទារ ទឹកមិនច្រើនដូចពួកអំបូរស្ពៃទេ។ការស្រោចទឹក គេនិយមរំកស្រោចនៅក្នុងករណីកូនសំណួរ នៅតូច ជាពិសេសពេលចេញផ្លូវនិងចាប់ផ្តើម ចេញកូរ ពីព្រោះកាលណាយើងស្រោចទឹក មិនបានជិតដល់វាបណ្តាលឱ្យជ្រុះផ្កា និងកូរ សំណួរក្តៅបន្តិចត្រាប់ ។ ប៉ុន្តែនៅពេល សំណួរកធំបន្តិច គេអាចបញ្ចូលទឹកតាមចន្លោះ រងដោយលែយ៉ាងណាឱ្យដីសើមល្មម បើសិន យើងបញ្ចូលទឹកច្រើនពេក អាចបណ្តាលអោយ សំណួរកយើងរលួយគល់ងាប់តែម្តង ។

ខ-ការស្នើសុំសេវា :

ការងារនេះយើងត្រូវធ្វើនៅពេលសំណួរ មានអាយុ ១០-១៥ ថ្ងៃ ដោយលែលកយ៉ាងណាកុំ អោយប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធបូសរបស់កូនសំណួរ យើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំរៀងរាល់សប្តាហ៍ បើឃើញ មានស្មៅដុះ ។

គ-ការស្នើសុំសេវា :

ការជួយដីមានពីរលើក គឺ :

-ជួយដីលើកទី ១ : នៅពេលសំណួរមានអាយុ ប្រហែល ៧-១០ ថ្ងៃ ក្រោយពេលដាំនិងពូនគល់ ដោយធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យប៉ះពាល់ដល់បូសរបស់វា ។
-ជួយដីលើកទី ២ : ធ្វើនៅមុនពេលដាក់ដីលើក ទី ២ នៅពេលសំណួរមានអាយុប្រហែល៣០ ថ្ងៃ ក្រោយពេលដាំ ។

ឃ-ការស្នើសុំសេវា :

សំណួរកូរជាប្រភេទដំណាំដែលទាមទារ ឱ្យមានទ្រើងសំរាប់វារកាងឡើងក្នុងការដុះលូត លាស់របស់វា ការដាក់ទ្រើងនេះធ្វើយ៉ាងយូរ បំផុត ១៥ ថ្ងៃ ក្រោយពេលដាំ ហើយកូនសំណួរ មានសន្លឹកពី ៣-៥ ទ្រើងដែលត្រូវដោតមានកំ ពស់ ១ ម កន្លះ . ២ ម ត្រូវចងឱ្យកូនសំណួរ ទោះវារកាងឡើង ត្រូវពិនិត្យ នឹងចងបន្ថែមទៅ តាមដំណើររបស់វា ។

ង-ការស្នើសុំសេវា :

ក្រៅពីការដាក់ដីទ្រាប់ចាត់ដំណាំសំណួរ កូរ គេត្រូវដាក់ដីបន្ថែមផងដែរ ដីបន្ថែមនេះគេ ត្រូវដាក់ ៣ សប្តាហ៍ ក្រោយពេលដាំ គឺក្នុងកំរិត

២០-៣០ ក្រាម ក្នុង១គុដ ចន្លោះពីគល់សំណួរ ១៥-២០ ស.ម លើកទី២ គេដាក់នៅពេលចេញ ផ្កា ការដាក់ដូចជារបៀបទីមួយដែរ ។

ច-សេចក្តីសង្ខេបនូវវិធានការស្នើសុំសេវា :

នៅលើដំណាំសំណួរកូរ គេតែងជួបប្រទះ សត្វល្អិតចង្រៃមួយចំនួនដូចជា :
-ពពួកចៃ
-ដង្កូវចោះផ្លែ
-ពឹងពាងក្រហម

វិធានការកំចាត់ :

ត្រូវពិនិត្យទៅលើកំលាំងបំផ្លាញរបស់សត្វ ល្អិតចង្រៃ បើមិនមានសភាពខ្លាំងក្លាទេ គេ មិនចាប់កំចាត់វាទេ បើមានចិត្តចូចគេអាចបូត ដោយដៃ ។ល។ ការប្រើប្រាស់ថ្នាំគីមីត្រូវធ្វើនៅ ពេលមានការបំផ្លាញខ្លាំងក្លា និងជាដំណោះ ស្រាយចុងក្រោយប៉ុណ្ណោះ ។

ថ្នាំពុលដែលត្រូវយកមកប្រើមាន :

-ហ្វូរាដង់ (Furadan) ៣ ក្រាម ក្នុង ១០ ម^២
-ឌីយ៉ាស៊ីណុង (Diazinon) ១៥ សេសេ ក្នុង ៣ លីត្រ ទឹក ។

-មេរិនហ្វូស (Mewimphose) ៣ សេសេ ក្នុង

១ លីត្រ ទឹក ។

-ស៊ុយមីស៊ីឌីន (Sumisudin) ៣.៥ សេសេ ក្នុង

៣ លីត្រ ទឹក ។

២-ការប្រមូលផល :

ការប្រមូលផលប្រព្រឹត្តិទៅបាននៅអាយុកាល ៥០ - ៦០ ថ្ងៃ ក្រោយពេលដាំ គេអាចប្រមូលផលបានពីដងក្នុងមួយប្លាស់ ។ ត្រូវឧស្សាហ៍ពិនិត្យមើលការលូតលាស់របស់ផ្លែសណ្តែក មិនត្រូវទុកឱ្យវាចាស់ជ្រុលពេកទេ ព្រោះអាចលក់មិនដាច់ប្លុលក់មិនបានថ្លៃ ។ ផ្លែសណ្តែកពេញនិយមពេលនៅខ្លីរស់ជាតិថ្លាញ់ និងអាចរក្សាទុកបានយូរជាងសណ្តែកដែលមានអាយុចាស់ ។ យើងអាចប្រមូលផលផ្លែដោយដៃ ឬ ដោយប្រើកន្ត្រែសំរាប់កាត់ ។ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប្រមូលផលម្តងៗ ធ្វើយ៉ាងណាកុំឱ្យដាច់ដើម ឬប៉ះដល់ផ្តាត់ឱ្យជ្រុះ គឺចាត់បង់ទិន្នផល ។ ក្នុងករណីយើងដាំបានល្អ យើងអាចប្រមូលផលបានទិន្នផលពី ២០.២៥ តោន ក្នុង ១ ហិកតា ។

៣-ការប្រមូលផល :

យើងត្រូវជ្រើសរើសផ្លែធំ កូរវែង រួចទុកផ្លែនោះអោយទុំស្អុត ហើយយកទៅហាលអោយបាន ២-៣ ថ្ងៃ រួចច្រកស្បោងក្រណាត់ទុកកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូល ។




ផលិតផលត្រូវបានយកមកលក់



២៣៤

២៣៤

ការកែច្នៃសំបកឈ្មួញកម្ពុជា



គម្រោងសំណង់កម្ពុជានីម៉ូ គណៈកម្មាធិការ អភិវឌ្ឍន៍

អាស៊ី (ADB) លេខ 1445-CAM (SF)

នាយកដ្ឋាន ផ្សព្វផ្សាយកសិកម្ម

លេខ : ១១ ផ្លូវ ២០០២

