


E40

Rats, Crabs and snails cont'd

E40



កណ្តុរ និងការកំចាត់

ក្នុងមួយឆ្នាំរាជធានីភ្នំពេញ បាត់បង់ដោយសារសត្វកណ្តុរចម្រើន ប្រមាណ ២០-២៥ ភាគរយ តាំងពីដំណាក់ក្នុងស្រែ ចំការ រហូតដល់ផលដាក់ក្នុងជម្រក ។

១ តើសត្វកណ្តុរជាអ្វី ?

- កណ្តុរអាចរស់បានយូរជាងមួយឆ្នាំ
- ក្នុងមួយឆ្នាំចេញពីកណ្តុរញីនិងសហូលមួយគូអាចបង្កើត កូនបានជាង ៥០០ ក្បាល ។




- តើវាបំផ្លាញស្រូវនៅពេលណាខ្លះ ? :
- វាគាត់បំផ្លាញសន្ទឹងទើបតែស្ទើររហូតដល់ស្រូវទុំ



• ជាទូទៅវាបំផ្លាញតាំងពីគ្រាប់ស្រូវធ្លាក់ដល់ដី រហូតដល់ក្នុង

ជម្រក ។




២

- វាគាត់ដើមស្រូវជិតគល់ដោយមាណស្រូវច ខុសពីការបំផ្លាញរបស់សត្វគោ ក្របី ។



តើវាបំផ្លាញស្រូវខ្លាំងជាងគេនៅពេលណា ?





ស្រូវផឹម


ស្រូវទុំ

៣


• វាច្រើនកាត់ដើមស្រូវនៅលេយប៉េ និងការបំផ្លាញរបស់វា ស្ថិតនៅកណ្តាលស្រែ ។




• តើអាចកំចាត់វាតាមរបៀបណាខ្លះ ?




សំអាតស្មៅតាមភ្លឺ និងពូជស្រែ




សំអាតចំដីពូជស្រែ ក្រោយពីប្រលាងរួច



កុំលើកភ្លឺជំពោក





ស្ទង់ប្រមាញ់ស្រូវផ្ទះ



ដាក់អង្កប


ជីកទន្ល ឬចាក់ទឹកក្នុងទន្ល អោយវាចប់ដំណើរ




ខុយ សត្វគ្នា ពស់ ខ្ញុំ ជាមិត្តរបស់កសិករ

១ គេអាចប្រើថ្នាំសាំងផ្លូស្តាតដើម្បីសម្រាប់វា ដោយប្រើដូចខាង

ក្រោមនេះ ៖




ដាក់បំពង់ទឹក ឬដើមបូស្សីស្របតាមភ្លើងស្រែ ហើយគ្របស្មៅ
ពីលើ ។ ព្រឹកឡើងទៅលើក រួចយកវាមកសម្អាតនៅដងផ្ទះ
ដើម្បីកុំអោយដងក្លិន ។



ខ្យងដាច់លាមក
ជាមួយថ្នាំ


គ្រាប់ស្រូវ ឬអង្ករ ឬបាយ
លាមកជាមួយថ្នាំ

១ ក្រោយពីស្ទង់បានពីរអាទិត្យ ក្នុងដីស្រែមួយហិកតា ត្រូវដាក់
 ឧស ៥ កន្លែង ដោយមានចំងាយពីគ្នា ៥០ ម៉ែត្រ យ៉ាង
 ជិត ។ កន្លែងល្អគឺជាកន្លែងស្រែ ។




៨

២ ត្រូវពិនិត្យបំពង់ឧស ៤ ថ្ងៃ បន្ទាប់មក ក្នុងបំពង់នីមួយៗត្រូវ
 ដាក់ឧស ៦ ស្ថាបត្រាបាយ ។ បើសិនកន្លែងមួយមានកណ្តុរ
 ក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងត្រូវពិនិត្យ បើសសឧសត្រូវបន្ថែមឧសទៀតទៅ
 ក្នុងបំពង់ ។



៩


១ ផ្លាស់ឧបដុះផ្លិត ឬសើមចេញ ហើយដាក់ឧបដុះ ។ ឧប
 ពេលប្រូតកាត់ពីអាទិត្យ ត្រូវបែបពងឧបចេញអោយអស់ពី
 ស្រែ ។




ក្លាម និងការកំចាត់

ក្លាមជាសត្វចង្រៃមួយប្រភេទដែលបំផ្លាញដំណាំស្រូវនៅខ្លះ ហើយ
 ក្នុងស្រែដែលហានុដក់ទឹក ។ ទទួមនិងនោះក្លាមក៏ជាមួយប្រចាំថ្ងៃ
 របស់កសិករយើងដែរ ។ ការបំផ្លាញរបស់វានៅពេលខ្លះមាន
 កំរិតខ្លាំងក្លា ។

១ សូមផ្អាកលើកឡើងវិញពីរបៀបរបបរបស់សត្វក្លាម



១ តើក្លាមកាត់ស្រែដូចម្តេច ?




កាត់ក្នុងទឹក

អាចកាត់លើដី

ពេលទឹកក្នុងស្រែក្តៅ

តើអ្នកដឹងទេថាក្លាមចូលចិត្តកាត់ដើមស្រែណា ដែលខ្លឹមតែប៉ុណ្ណោះ



ដើមស្រូវខ្ចី

ដើមស្រូវចាស់

២ តើត្រូវការពាររបៀបណា ?

៣ អ្នកដឹងទេថា ក្លាមវាយឱ្យចូលចិត្តកាត់ស្រែនៅក្នុងស្រែដែលអត់

មាឌទឹក ។



ខ្ជិលកាត់ណាស់




១២

៤ ពង្រាបដីអោយ បាឌស្មី ល្អ កុំអោយមាឌទឹកដក់


ថែរក្សាកុំអោយមាឌទឹកក្នុង ស្រែយូរពេក បន្ទាប់ពីស្ងួតបាឌ ១០-១៥ ថ្ងៃ បើអោយធ្វើបាន



១៣




ព្រៃពង្រួលដែល មានក្ដាមច្រើន ប្រើលេងទា អោយចូលស៊ីកូនក្ដាម
 គេអាចប្រសរោយក្រាស់ ដើម្បី ក្នុងស្រែ ដែលមានទឹកបន្ទាប់ពី
 អោយដើមស្រូវ ទៅសល់បាន សន្ទូង និងពង្រួល (ប្រយ័ត្នខ្លួន
 ច្រើន បន្ទាប់ពីក្ដាមកាត់ហើយ ។ សន្ទូង) ។




ប្រើដើមជុំស្រែង




ប្រើលេងសត្វទាអោយ ចូលស៊ីកូន
 ក្ដាមបន្ទាប់ពីធ្វើដីរុចតាម ។



ចាប់យកមកធ្វើម្ហូប




ដាក់លប ឬទ្រុដោយមានមុយ



ដាក់បោតយកក្ដាម

១ គេក៏អាចដាក់ថ្នាំពុលបានដែរ (ហ្វូលីដុល) នៅពេលយើងមិន
អាចធ្វើតាមវិធីខាងលើ ចំពោះស្រែណាដែលនៅឆ្ងាយពីភូមិ
ដើម្បីកុំអោយដាច់មាត់ទា ដោយធ្វើដូចវិធីខាងក្រោមនេះ ៖



វាយពាមថ្នាំ

ខ្យងស៊ីស្រែ

១ តើអ្នកយល់យ៉ាងណានៅពេលអ្នកឮគេនិយាយថា មានដង្កូវ
ហ្វូងស៊ីសំណាម ឬសត្វដទៃទៀតស៊ីស្រែ ?



- ២ ចុះយើងដង្កូវហ្វូង នោះកាត់
សំណាម ឬសត្វដទៃ
អសិប្ប តើអ្នកមានការ -
ម្នាក់យ៉ាងណាដែរ ?


៣ ឥឡូវនេះមានគ្រាប់អ្នកថា មានខ្យងមួយប្រភេទ ដែលស៊ីស្រែ
តើអ្នកជឿដែរឬទេ ?




- អ្នកបច្ចេកទេសបានពិសោធផ្តលើបាឡាឡូងស្រូវវែមន
- គេបានដាក់ឈ្មោះអោយវាថា : ឡូងស្រូវវែម
- តើឡូងស្រូវវែមស្រូវវែម ? ចម្លើយ : គឺអត់
- តើឡូងស្រូវវែមនេះមកពីណា ? ចម្លើយ : គឺមានអ្នកយកមកពីប្រទេសជិតខាង ។
- តើមូលហេតុអ្វីបានជាគេយកវាមក ? ចម្លើយ : គេយកមកដើម្បីចិញ្ចឹមទុកហូប ឬលក់ ហើយម្យ៉ាងទៀតគេអត់ទាន់ដឹងថាឡូងនេះនៅស្រូវវែម ។



- ចុះតើឡូងនេះស្រូវវែមនៅកន្លែងណាខ្លះហើយ ? ចម្លើយ : មិនទាន់ដឹងនៅឡើយ តែសូមប្រយ័ត្នព្រោះឡូងស្រូវវែមនេះបានរុះរើចេញពីកន្លែងចិញ្ចឹម ហើយកើតកូនកើតចៅនៅតាមផ្ទះស្រូវវែមត្រកាំងដែលនៅជាប់ស្រែហើយ ។
- តើឡូងស្រូវវែមនេះ តើវាស្រូវវែមពេលណា ? ចម្លើយ : វាស្រូវវែមវិញ ទាំងយប់ ប៉ុន្តែវាចូលចិត្តស្រូវវែមពេលព្រឹក និងល្ងាច ។
- ចុះវាស្រូវវែមកណាខ្លះនឹងដើមស្រូវ ? ចម្លើយ : វាស្រូវវែមស្លឹកនៃសំណោប ឬសន្ទូង និងពង្រោះណាដែលនៅឆ្និល ។



តើវាខុសពីខ្យងយើង (ខ្យងធម្មតា) ដូចម្តេចទៅ ? ចម្លើយ :
ដោយណាស់ ចូរឆ្លុះពិនិត្យមើលរូបខ្យងក្រោមនេះ ៖




មាឌខ្យងចូលក្នុង

ខ្យងស៊ីស្រូវ

អត់មាឌខ្យង

ខ្យងធម្មតា



តាមសរសេរផ្ទះ ឬ បង្គោល


ពងកញ្ចៀមលដាក់

ដើមស្រូវផុតពីខែកកដាពណ៍ផ្កាល្អក តាមភ្លឺឬខ្យងពងមាឌពណ៍ស

តើគួរចិញ្ចឹមខ្យងនេះទុកហួច ឬលក់ដែរឬទេ ? (មិនគួរបោះ
ថា ៖ (១) មិនទាន់យើញឆ្លុះពិនិត្យមើលណាមួយមាឌខ្យងនេះលក់
នៅក្នុងទីផ្សារទេ (២) ខ្យងនេះវាដឹងស៊ីស្រូវរបស់អ្នក ហើយ
អ្នកដឹងខ្លះស្រូវហួច (៣) យើងមាឌខ្យងស្រែ ដឹងខ្យងចឹង
ច្រើនណាស់សំរាប់ហួច ដឹងលក់ ។

តើត្រូវធ្វើរបាំងណាដើម្បីកំចាត់ខ្យងស៊ីស្រូវនេះ ? ចម្លើយ :
គេមិនអាចកំចាត់វាទាំងស្រុងភ្លាមៗបានទេ តែគេអាចកំចាត់វា
ជាបណ្តើរៗ ដោយធ្វើតាមវិធីទាំងក្រោមនេះ ៖


- ដើរមើលខ្យងស៊ីស្រូវមក



ធ្វើម្តុច

លាងដៃមុនពេលដកស្រូវចេញពីកញ្ចប់
ដាក់ស្រូវចេញពីកញ្ចប់

ក្រដាសស្រូវស្រស់



ស្រូវស្រស់

ស្រូវស្រស់

ស្រូវស្រស់

ស្រូវស្រស់


ស្រូវស្រស់

ស្រូវស្រស់


ការដកស្រូវចេញពីកញ្ចប់

កម្មវិធីលាងស្រូវស្រស់

លាងស្រូវស្រស់




កម្មវិធីលាងស្រូវស្រស់




ដកស្រូវចេញពីកញ្ចប់

លាងស្រូវស្រស់



ការដកស្រូវចេញពីកញ្ចប់

ដាក់សំណាញ់នៅកន្លែងមុខទឹកហូរ កុំអោយវាដួងពីស្រែមួយ
ទៅស្រែមួយទៀត ហើយដើររុបមូលជារៀងរាល់ព្រឹក ។



៥. តើមានថ្នាំពុលណាដែលសម្រាប់ឲ្យដង្រូងនេះដៃរហូត ?
 មាន ៤ យ៉ាងគួរកុំប្រើពិសេស៖ ៖ (១) ថ្នាំសម្រាប់ឲ្យដង្រូង
 ដួងនេះ មិនទាន់មាននៅក្នុងប្រទេសយើងនៅឡើយ (២) ថ្នាំ
 ពុលប្រភេទនេះមានតម្លៃខ្ពស់ (៣) បើគេប្រើវា វានឹងសម្រាប់
 ត្រី កង្កែប និងសត្វមានជីវិតដទៃទៀតដែលរស់នៅក្នុងស្រែ ។

ប្រការត្រូវចងចាំ : ឲ្យដង្រូងនេះបំផ្លាញដំណាំស្រូវ ខ្លាំងជា
 សត្វក្តាមទៅទៀត ។