


... .. ၂၈
တစ်ပတ်လုံး နေ့စဉ်



ခံနိုင်ရည်ရှိသော အပင်



ដំណាំ ហោត

I ស្ថានភាពដំណាំពោតនៅប្រទេសកម្ពុជា

ពោតដំណាំមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងចំណោមដំណាំឆ្លៀងសំខាន់ៗទៀត ។ ដំណាំនេះមានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី ៣ សំរាប់ការនាំចេញទៅលក់នៅបរទេស បន្ទាប់ពីដំណាំស្រូវនិងកៅស៊ូ ។ ម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើយើងទាក់ទាញនិយមនិព្វាន ទុកសំរាប់តែប្រើប្រាស់ដំណាំអាហារបន្ទាប់បន្សំដូចជា និត, ល្ងោរ, អាំងបង្កើត ។ ល។ និងទុកសំរាប់ដើម្បីសតបំណែង។

ដំណាំពោតនេះ មានចាប់ផ្តើមនាំចេញប្រទេសកម្ពុជាយើង ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩១៧-១៩១៨ (សម័យអាណានិគមនិយមបារាំង) ហើយមានឈានឡើងដំណាំពោតជាតិ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩១០ ។ សព្វថ្ងៃនេះ ដំណាំពោត មានចំណុះយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារ មានបញ្ហាមួយចំនួនដូចតទៅ :

- គ្រាប់ពោតមានតម្លៃទាប
- កសិករពុំមានពូជល្អ គុណភាពល្អ ដូច

ទិន្នន័យទូទៅ ។

- ដំណាំក្រូចស្រោច ដីខ្សោះដីស្ងួត ។

ឆ្នាំ 1980 - 1984 យើងដាំ

ពោតបានលើដី 68,7 ពាន់ហិកតា ហើយ

ដល់បរិមាណសរុបបាន 67,6 ពាន់តោន ។

នៅឆ្នាំ 1991-92 នេះ យើងដាំបានលើ

ដី 66 ពាន់ហិកតា ហើយទទួលបានសរុប

មាណ 60 ពាន់តោន ប៉ុណ្ណោះ ។ ក្នុងចំណោម

សេចក្តីក្រុមការងារគ្រាប់ពោត សំរាប់ឆ្នាំ 21 លាន

តោន នៅឆ្នាំ 1991 - 92 ។

ក្រូចស្រោច	ឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រ	អង់គ្លេស	បារាំង
ពោតស	zea mays	white corn	Mais blanc
ពោតហ្វូង	Zea Mays Vra rugosa	Sweetcorn	Mais doux
ពោតក្រហម	Zea Mays	Red corn	Mais rouge

II សារៈប្រយោជន៍ នៃ ដំណាំពោត

ពោតដំណាំពោត មួយប្រភេទយ៉ាងសំខាន់
សំរាប់បំប៉នការហ្វូងចក របស់មនុស្សសត្វ ។

១- សាច់ដំណាំរបស់មនុស្ស

ក/ សាច់ដំណាំអាហារប្រចាំថ្ងៃសំរាប់ប្រទេស
មួយចំនួនដើម្បីយកពោតសំរាប់អាហារមូលដ្ឋាន ។

ខ/ សាច់ដំណាំអាហារបន្ថែមសំរាប់អាហារមូល

III - លក្ខណៈរូបសាស្ត្រនៃសំណាំពោត

សំណាំពោត វិភាគសាត់មួយបែបដែលមាន
រកាយកាលស្រស់ស្រាយសម្របនៃការ
ដាំដុះ ក្នុងរយៈពេល 85 ថ្ងៃ 90 ថ្ងៃ 100 ថ្ងៃ
110 ថ្ងៃ 130 ថ្ងៃ និងរហូតដល់ 185 ថ្ងៃ ។
ចំពោះពូជពោតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
ទ្រង់មានរកាយកាល 85 ថ្ងៃ 90 ថ្ងៃ និង 110
ថ្ងៃ ប៉ុណ្ណោះ ។

ដាំទៅលើមពោតទ្រង់មានកំពស់ពី 1,50 ទៅ
3,00 ។ ដោយឡែកនៅអាមេរិកខាងត្បូង
កំពស់ពោតមានរហូតដល់ 9 ម ។

ពោតមានស្លឹករាងសាបន្ត្រូងចង្រៃ មាន
បណ្តោយប្រហែលជា 1 ម ទទឹងពី 7-15 ស.ម
ស្លឹកវាមានដុះចេញពីច្រំដំបូងនៃកំពូលដំបូង
មួយទៅមួយ ។ លក្ខណៈពិសេសចំពោះសំណាំ
នេះ គឺនៅលើមពោតតែមួយមានដុំដំបូង និង
ដំបូងលើស្រទាប់សាបយក តែដំបូងលើស្រទាប់
ដំបូងខាងលើនៃមពោត និងដំបូងលើស្រទាប់
កណ្តាលនៃមពោត ។ ដំបូងលើស្រទាប់ដំបូង
នៃមពោតនេះនឹង ។

IV - បច្ចេកទេសដាំដុះ

១ - ការជ្រើសរើសពូជ

- គ្រាប់ពូជល្អ ស្ថិតនៅក្នុងស្រូវ
- គ្រាប់ពូជល្អ ដែលមានភាពស្អាតលើសពី 95%
- គ្រាប់ពូជដែលមានកម្រិតនីម៉ាតូស៊ីនលើសពី 85%
- គ្រាប់ពូជដ៏ មិនទុកយូរទេ ឆ្នាំពោក ។
- គ្រាប់ពូជគង់ទាំងនឹងដី ឬ សត្វល្អិតបំផ្លាញ និងមិនប្រេះបែក ។

២ - ជំនិះកាលដាំដុះ

នៅតំបន់ត្រូពិក ពោតដាំដំណាំមួយដែល មិនទើបជំនិះកាលដាំដុះ គឺ អាចដាំ បានគ្រប់ពេល វេលា ។

ដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជា គេអាចដាំ ពោតបានល្អនៅតាមបណ្តាខេត្តមួយចំនួនតាមដី ទន្លេស្ទឹងស្រះ : ខេត្ត កណ្តាល , ព្រៃវែង , កំពង់ចាម , ក្រចេះ , កំពង់ឆ្នាំង និង តំបន់ជ្រកហាម ។

ចំពោះដីនៅតាមមាត់ទន្លេ គេអាចដាំបានក្នុង 1 ឆ្នាំ 2 ដង ព្រោះដាំតំបន់ដែលអាចធានាបាន ទឹកនិងដីដាំបានគ្រប់គ្រាន់ ។

- ជំនិះវិស្សា : ចាប់ពីចុងខែមេសា ដល់

ពាក់កណ្តាលខែ ១ សប្តាហ៍ និងប្រមូលសិលនៅចុង
ខែសីហាចំពោះតំបន់សីតាមមាត់ទន្លេ និងចាប់ពី
ខែ ១ សប្តាហ៍ និងខែកក្កដា និងប្រមូលសិលនៅ
ចុងខែ កញ្ញា ចំពោះ នៅតំបន់ស្ទឹងក្រហម ។

- វិនិច្ឆ័យ : នាំបានចាប់ពីវិនិច្ឆ័យកសិកម្ម
ក៏ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកា រហូតដល់ខែមករា
ហើយប្រមូលសិលនៅចុងខែមីនា និងដើមខែ
មេសា ។

៣ - ការរៀបចំដី :

- នៅវិនិច្ឆ័យ ការភ្ជួរដី ត្រូវរក្សាបាន
ម៉ត់ល្អ ដើម្បីរក្សាសំណើមក្នុងដីបានយូរហើយ
អាច ភ្ជួរដី ហាលត្រឹមត្រូវ 5 - 15 ថ្ងៃបំណោះ ។

- នៅវិនិច្ឆ័យ ភ្ជួរដី គេចាំចាំបាច់ រក្សាសំណើម
ម៉ត់ល្អ ព្រោះអាចបណ្តាល ទោលដី គាប់
ហាប់ បន្ទាប់ពីភ្ជួរដី ។ ការភ្ជួរហាលដី
ដំពោកក្នុងវិនិច្ឆ័យនេះ ត្រូវរក្សាបានពី 1 ខែ
ទៅ 2 ខែ ដើម្បីសម្រាប់ភ្ជួរដី , សត្វល្អិត
ដើម្បី ព្រាមទាំងបង្កើនបន្តិចខ្យល់ ក្នុងដី រក្សាបាន
ល្អ ចំពោះទឹក ។

៤ - របៀបដាក់ដី :

លើកទី 1 : ដាក់ដី ចាប់ពី ១ ម៉ែត្រ ដល់ 1 ហិកតា
- ដីលាមកសត្វចំនួន ពី 5 - 10 តោន ភ្ជួរលប់
បន្តិចលើដី

- ឆ 15.15.15 ឬ 16.20.0 ចំនួន ៧ 200.

300 គ.ក្រ ។


លើកទី៧ : ដីរយវ័យ ដាក់នៅពេលពោត
ចេញស្លឹក 6 - 8 សន្លឹក ឬនៅពេលពូនកល់លើក
ទី 2 ។

ចំពោះប្រភេទដីក៏ដូច រដូវវស្សា រដូវប្រាំង
អាច ដាក់ពី 50 - 150 គ.ក្រ ក្នុង 1 ហិកតា ។
ឬសសរ ពី 30 - 90 គ.ក្រ ក្នុង 1 ហិកតា និង រដូវ
វស្សា ដាក់ពី 50 - 130 គ.ក្រ ក្នុង 1 ហិកតា ។
រដូវវស្សា ក៏ដូច ដីស្រូវ ដាក់តាម ដំណាក់កាល
លូតលាស់របស់ពោត :

ពេលវេលា ដីស្រូវ ដាក់	បរិមាណ រដូវ វស្សា ក៏ដូច N - P - K	របៀបដាក់ ស្លឹក
ដាក់ពេល គួរ រាង មុន ដំបូង ដាក់ ពេល ពោល ដំបូង	25.30% - 100% - 100%	ដាក់ ទ្រាប់ បំប៉ន
ពេលពោត មាន អាយុ កាល លូតលាស់ 30 ថ្ងៃ នៅពេល ពូន កល់ លើក ទី 2	50.70% - 0% - 0%	ដាក់ បំប៉ន

* សេចក្តីបញ្ជាក់ : ដាក់ ដី ទ្រាប់ បំប៉ន មាន ពីរ យ៉ាង
គឺ ទ្រាប់ បំប៉ន ពេល ដំបូង និង ដាក់ នៅ ពេល ដំបូង គោយ
ពេល នៅ ក្បែរ គ្រាប់ ចម្ងាយ ប្រហែល 5 ស.ម ។
ចំពោះ ដី បំប៉ន គ្រូវ ដាក់ ពេល នៅ ក្បែរ កល់ ប្រហែល
5 ស.ម ចំពូន កល់ សប់ ខែ ម្តង ។

សិទ្ធិម្រាបដំបូលគ្រប់ ឬ បុកដំ គ្រឹះ
 គ្រប់ដំបូលសភាពសំណើដំបូលមាននៅក្នុងដំ
 ចំពោះដំបូល ឬ ដំបូលដំបូល ការកប់ឬបុក
 ដំបូលដំបូលដំបូល គ្រប់ដំបូល 3-5 គ.ម ។
 ដំបូលដំបូល ឬ ដំបូលដំបូល ការកប់ ឬ
 បុកដំបូលដំបូល គ្រប់ដំបូល គ្រប់ដំបូល
 ហោល 5-8 គ.ម ។



V - ការថែទាំ :

ក. ការស្តុសកូន : ក្រោយពេលសាំ ឬ កប់ដី បាន 2-3 ថ្ងៃ ក៏ពេលគ្រាប់ពោត ចាប់ផ្តើមចេញ ពន្លក បើយើងព្រាគ្រាប់ដើម មិនដឹង មានតិចសិន 10% យើងមិនចាំបាច់ស្តុសទេ តែបើគ្រាប់មិន ដឹងមានច្រើន គ្រូវិប្បញ្ញាប័និកគ្រាប់ដីសាបនាស់ ដើម្បីធានាបាននូវចំនួនដើម កង ដើមដី ។ ហើកតា នឹងដើម្បីធានាបរិមាណសីលបានច្រើន ។

ខ - ការស្តុសបំបែកកូនពោត : ក្រោយពេល កូនពោតដុះបាន 15 ថ្ងៃ ឬនៅពេលកូនពោត មានស្លឹក 3-4 ស្លឹក មានកំពស់ប្រមាណ 10- 15 ស.ម គ្រូវិប្បញ្ញាប័និកបំបែកដើមចេញខ្លះ ទុកតែ 1 ដើមឬ 2 ដើម នៅតាមចន្លោះស្តុស និង ចន្លោះគ្រាប់ខាងលើ ។ ដើមដើមទុក គ្រូវិប្បញ្ញា យកដើមណាដែលដ្ឋាន មានភាពរឹងមាំដុះ ល្អតណាស់ល្អសិនគេ ។ បើទុកដើមច្រើនក្នុង មួយគ្រាប់ចន្លោះ ពោតដុះមិនស្មើគ្នា ខាតដី ភាគី ដើមដើម ខ្លះមួយ ដុះដើមតូច ដុះបាន ដើម ឬ មានដើមដើមតែ មិនសូវដុះដុះគ្រាប់ណាន ឡើយ ។

គ. ការស្តុសដី ដើម្បី ពន្លកល់ :
- ក្រោយពេលស្តុសបំបែកកូនពោតពេល

ខ្លះហោយ ត្រូវតាមដោយដោយស្រួល ដើម្បីស្រាវជ្រាវ
 ព្រះគម្ភីរលើកទី 1 ដើម្បីអោយដឹងពី ដំណើរការ
 ព្រះគម្ភីរ ឬសញ្ញាព្រះគម្ភីរ ខ្យល់ចេញចូល
 ព្រះគម្ភីរ ។

- ពេលពេលមានអាយុ 40 ថ្ងៃ ឬយើង
 ពេលពេលស្លឹកព្រះគម្ភីរ 6-8 ស្លឹក ត្រូវដោះ
 ចេញពីដំណើរ និងព្រះគម្ភីរលើកទី 2 ដើម្បី
 អោយឫសដើមឫសបន្ថែមទៀត និងអោយ
 ពេលពេលស្លឹកព្រះគម្ភីរ ។ ដំណើរការយើង
 អាចដោះស្រាយ ព្រះគម្ភីរ 3-4 ស្លឹក ក្នុងរយៈ
 ពេល 1-2 ថ្ងៃ ដើម្បីដោះស្រាយ ។ បើ
 យើង បញ្ជាក់អោយស្រាយដោះស្រាយនោះ
 ខ្លះដល់ពេល និង ចេញចុះ ព្រោះវាដំណើរការ
 ដំណើរការ ។ ប្រសិនបើ ដោះស្រាយដំណើរការ
 លោកខ្លះរបស់សត្វ ចង្រៃ ឬយើង ដោះស្រាយ
 សត្វកណ្តាលដំណើរ ។ ល។

VI ការប្រមូលផល :

យើងអាចសន្និដ្ឋានថា ដើម្បីពេលពេល ដើម្បី
 ដោះស្រាយលក្ខណៈប្រយោជន៍ :

- ១ - អាយុកាលរបស់ប្រភេទព្រះគម្ភីរ
- ២ - លក្ខណៈរបស់ដើម ពេលមានពណ៌

ល្បឿន ហើយក្រៀមស្នូត ស្លឹកពណ៌ល្បឿន
 ដូចស្លឹកឈើស្រាប់ សំបកដៃស្នូតក្រៀមស្រុយ
 ដូចក្រណាត សក់វាឡើងទៅស្រុយ គ្រាប់
 ភ្នំរលោង ហើយវិស ។

៣ - សំណើបក្កដា គ្រាប់ មានតម្លៃ 25%
 នៅពេលប្រមូលសេស ។

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៩ ខែ មករា 1995

រៀបរៀង និង ចងក្រងដោយ

- លោក ផង - ឧបនាយក

ប្រធានស្ថាប័ន រៀនសូត្រ និង ដំណើរ
 ព្រះពោធិបនាយកដ្ឋាន

- លោក ខ័ន វិសុក

វិស្វករក្រុមប្រឹក្សា

- កែសម្រួលដោយ គណៈកម្មការ

ចងក្រង រក្សាបទ បច្ចេកទេស នាយក

ស្ថាប័ន - ក្រុមប្រឹក្សា

ផ្សាយចេញពីនាយកដ្ឋានក្សេត្រសាស្ត្រ សហការ
ជាមួយអង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិ (W.V.I)