



បណ្ឌិតសិកម្មខេត្តកណ្តាល

ដំណាំម្ទេស



អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង ផ្លូវលេខ ១០៣ (តាខ្មៅ)

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ (០២៣ ៩៨៣ ៤៦១)

(០១២ ៨២៤ ៤២៥)

ឧបត្ថម្ភដោយ: អង្គការវិវឌ្ឍន៍ VVOB



ឆ្នាំ ២០១០

ដំណាំម្ទេស

១. លក្ខណៈទូទៅ

ដំណាំម្ទេស គឺត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ និងពេញនិយម ប្រើប្រាស់ជាយូរយារណាស់មកហើយ។ លក្ខណៈពិសេសរបស់ ម្ទេសគឺមានរសជាតិហ៊ឹរ ពេលទុំមានពណ៌ក្រហម មានក្លិនឆ្ងល់ ហើយអាចលូតលាស់យូរឆ្នាំជាងពួកដំណាំក្នុងគ្រួសារដូចគ្នា។

២. ការជ្រើសរើសពូជ

ការជ្រើសរើសពូជត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចតទៅ:

- ពូជសុទ្ធ មានប្រភពច្បាស់លាស់ និងផ្តល់ឱ្យទិន្នផលខ្ពស់
- ពូជធន់ទៅនឹងជម្ងឺ-សត្វល្អិត និងមានអាយុកាលខ្លី
- ពូជដែលមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងការដាំដុះ
- ពូជដែលមិនប្រកាន់រដូវ គឺអាចលូតលាស់បានគ្រប់រដូវ
- ពូជមានគុណភាពល្អ និងមានដំណុះខ្ពស់លើស ៨៥%

៣. ការជ្រើសរើសពេលវេលាដាំដុះ

ពេលវេលាសមស្របសំរាប់ការដាំដុះម្ទេស គឺមានពីរ:

- ចំពោះតំបន់លិចទឹក គឺចាប់ផ្តើមពីខែ តុលា ដល់ខែមិនា ហើយពន្យារពេលប្រមូលផលរហូតដល់ខែកក្កដា ឬសីហា
- ចំពោះតំបន់មិនលិចទឹក គឺចាប់ផ្តើមពីខែមិថុនា ឬខែ កក្កដា ហើយធ្វើការប្រមូលផលបញ្ចប់នៅខែវិច្ឆិកា ឬធ្នូ។

៤. ការជ្រើសរើស និងរៀបចំដី

ការជ្រើសរើសដី

- ដីមានជីជាតិល្អ នៅក្បែរប្រភពទឹក
- ដីល្បាប់ល្បាយខ្សាច់ ធ្ងន់ សម្បូរទៅដោយជាតិមមោក និងសារធាតុចិញ្ចឹមខ្ពស់

- ជៀសវាងការជ្រើសរើសដីដែលដាំម្ទេសយូរឆ្នាំ ឬពួក គ្រួសារតែមួយដូចជាប៉េងបោះ គ្រប់.....។

ការរៀបចំដី

ការរៀបចំដីមានសារៈសំខាន់ណាស់ ព្រោះវាជួយធ្វើឱ្យដីធ្ងន់ មានខ្យល់ចេញចូលគ្រប់គ្រាន់ និងរក្សាសំណើមដីបានល្អ ព្រមទាំងជួយធ្វើឱ្យមានលំនឹង ពពួកបាក់តេរីមានប្រយោជន៍ ដោយ ត្រឡប់ពីលើចុះក្រោម និងពីក្រោមឡើងលើ។

ការភ្ជួរឱ្យបានជ្រៅ គឺធានាដល់ការចាក់ឬសរបស់ដំណាំ ព្រោះឬស គឺជាប្រព័ន្ធមួយសំរាប់ជួយដល់រុក្ខជាតិក្នុងការជញ្ជូន យកសារធាតុចិញ្ចឹម និងទឹកទៅផ្នែកសរីរាង្គដទៃទៀត។

ក្រៅពីភ្ជួរឱ្យបានជ្រៅ ដីត្រូវរាស់ឱ្យបានហ្មត់ល្អ និងកៀរ ឱ្យបានរាបស្មើ ដោយប្រមូលយកកំទេចកំទីរុក្ខជាតិដែលនៅ សេសសល់ពីរដូវមុន រួមជាមួយស្មៅចង្រៃចេញ។

ការលើករង

ក្រោយពីរៀបចំដីរួចហើយ គេត្រូវលើករងឱ្យបានខ្ពស់គឺពី ២០-៣០សង្ក្រែម៉ែត្រ (អាស្រ័យទៅតាមតំបន់លិចទឹក ឬមិនលិច ទឹក) ទទឹងរងអាស្រ័យលើវិធីសាស្ត្រដាំដុះ(បើដាំមួយជួរ ទទឹង រងគឺ ៦០-៨០សង្ក្រែម៉ែត្រ បើដាំពីរជួរ ទទឹងរង គឺ ១០០-១២០ សង្ក្រែម៉ែត្រ) រីឯបណ្តោយគឺអាស្រ័យទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្តែង របស់ដី។

៥. បច្ចេកទេសដាំដុះ

ដំណាំម្ទេសអាចដាំដុះដោយការបណ្តុះកូនដូចជាគ្រប់ និង ប៉េងបោះដែរ។

ការបណ្តុះកូន

គេអាចសាបកូនដោយគ្រាន់តែយកគ្រាប់ពូជទៅសាបលើ ថ្នាលផ្ទាល់ រហូតដល់វាមានអាយុ ៣៥-៤០ថ្ងៃ ពេលគឺមាន ស្លឹក ៣-៤ ទើបយកទៅដាំ។ តែដើម្បីឱ្យកូនម្ទេសលូតលាស់

បានលឿនហើយឆាប់បានយកទៅដាំ គេប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងមួយទៀត គឺត្រូវយកគ្រាប់ម្តេសទៅហាលថ្ងៃ ១-២ម៉ោង ឱ្យក្តៅ រួចយកទៅត្រាំទឹកក្តៅក្នុងកំរិត ៥០អង្សាសេ រយៈពេល ២០-៣០នាទី បន្ទាប់ត្រាំទឹកធម្មតារយៈពេលមួយយប់ ទើបស្រង់យកទៅផ្តាច់នៅកន្លែងសើម-ងងឹត ២យប់ទៀត ពេលនោះគ្រាប់ពូជនឹងចាប់ដុះចេញពន្លក ហើយអាចយកទៅសាបលើថ្នល់។ រយៈពេល ១០-១២ថ្ងៃ ពេលកូនម្តេសដុះចេញស្លឹកតំបូង២សន្លឹក គេអាចដកយកទៅស្ទូងផ្សំក្នុងកន្លែងនៅក្រោមផ្ទះសំណាញ់ ឬគ្របការពារកំដៅថ្ងៃរយៈពេល ២-៣ថ្ងៃ។ គេអាចស្រោចទឹកមួយថ្ងៃពីរដង (ព្រឹក-ល្ងាច)។ ក្រោយផ្សំបានរយៈពេល ៧ថ្ងៃ គេអាចយកជីអុយវេចំនួន ១ ស្លាបព្រាបាយមកលាយទឹក ១៥លីត្រ ស្រោចឱ្យជោគ រួចហើយស្រោចទឹកធម្មតាលាងតាមក្រោយ។ វិធីនេះជួយឱ្យកូនម្តេសលូតលាស់ស្មើគ្នាហើយថ្លោសល្អ។ ក្រោយផ្សំរយៈពេល ១៨-២០ថ្ងៃ (ពេលកូនម្តេសមានស្លឹក៤-៥ និងមានកំពស់ ៧-១២សង្កឹមម៉ែត្រ) គឺអាចយកទៅដាំបានហើយ។

ការប្រើប្រាស់ដី

វិធីសាស្ត្រដាក់ដីមានដូចតទៅ:

- ប្រើប្រាស់ដីកំប៉ុស្តិ៍ ៧-១០តោន និងដី ១៥-១៥-១៥ ចំនួន ២០០គីឡូក្រាមក្នុងមួយហិចតា សំរាប់ដាក់ទ្រាប់បាតមុនពេលដាំ ឬស្ទូង
- ដាក់បំប៉នក្រោយពេលដាំ ឬស្ទូងរយៈពេល ១៥-២០ថ្ងៃ ប្រភេទជី ១៥-១៥-១៥ ចំនួន ២០០គីឡូក្រាម និងជីប៉ូតាស្យូមក្លរួ (គជល) ចំនួន ៥០គីឡូក្រាម ក្នុងមួយហិចតា

- ដាក់បំប៉នចុងក្រោយបង្អស់ គឺក្រោយពេលប្រមូលផលលើកទី ១ ប្រភេទជី ១៥-១៥-១៥ ចំនួន ១០០-១៥០ គីឡូក្រាមទៅតាមសភាពលូតលាស់របស់ដំណាំ។

ការថែទាំ

ការថែទាំរាប់ទាំងការស្រោចស្រព ការសំអាតស្មៅ ជ្រំដី ពូនគល់ និងដោតចំណារ។

ដំណាំម្តេសត្រូវការទឹកជាមធ្យម (សំណើមដី ៦៥-៧០%) ដូច្នេះនៅរយៈពេល ៣ ថ្ងៃដំបូងក្រោយស្ទូង គេត្រូវស្រោចដោយប៉ោតថ្មមៗ បន្ទាប់មកគេបញ្ជូនទឹកឱ្យបាន ២ភាគ៣ នៃកំពស់រង ហើយបិទរក្សាទឹកនៅក្នុងចន្លោះរងនោះ។ គេអាចស្រោចទឹកដោយប៉ោតរៀងរាល់ថ្ងៃ ឬបញ្ជូនទឹក ២-៣ ថ្ងៃម្តង ទៅតាមប្រភេទដី និងអាកាសធាតុជាក់ស្តែង។

ការសំអាតស្មៅលើកទី ១ ត្រូវធ្វើនៅក្រោយពេលស្ទូង ១០-១៥ថ្ងៃ ដោយជ្រំដីឱ្យផុស ហើយពូនរងសារជាថ្មីម្តង ទៀត និងចាប់ផ្តើមដោតចំណារខ្លីៗ (កំពស់ ៧០-១០០ សង្កឹមម៉ែត្រ)។ ការសំអាតស្មៅ និងជ្រំដីលើកទី ២ គឺធ្វើនៅ មុនពេលចេញផ្កា (ក្រោយដាំ ២០-២៥ថ្ងៃ)។ លើកទី ៣ គឺគ្រាន់តែសំអាតស្មៅតែប៉ុណ្ណោះ (ការពារកុំឱ្យដាច់ឬស) គឺនៅពេលដែលម្តេសផ្តែ ១០០% ។

៦. ការប្រមូលផល

ការប្រមូលផលអាចធ្វើឡើងក្រោយពីដាំ ឬស្ទូងរយៈពេល ៦៥-៨០ថ្ងៃ អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទពូជ និងរដូវកាល។ ការប្រមូលផលចែកចេញជាបីផ្នែក:

ការប្រមូលផលសំរាប់ទីផ្សារ

ការប្រមូលផលសំរាប់ទីផ្សារ គឺអាចធ្វើឡើងនៅពេលដែលឃើញថាម្តេសទុំស្រុះគ្នា រវាងផ្លែដែលចេញមុន និងផ្លែដែលចេញក្រោយ (ម្តេសផ្តែបន្តគ្នាពីក្រោមឡើងលើ)។

ការប្រមូលផលសំរាប់កែច្នៃ

ការប្រមូលផលសំរាប់កែច្នៃ គឺអាចធ្វើឡើងយឺតជាងការប្រមូលផលសំរាប់ទីផ្សារ ៤-៥ថ្ងៃ (ដោយទុកឱ្យទុំក្រហមពិតប្រាកដ ព្រោះគេយកទៅកែច្នៃធ្វើជាម្តេសក្រៀម ឬទឹកម្តេស)។

ការប្រមូលផលសំរាប់ទុកពូជ

ការប្រមូលផលសំរាប់ទុកពូជ មានលក្ខណៈខុសពីការប្រមូលផលទាំងពីរខាងលើ គឺមិនទុកឱ្យមានចំនួនផ្លែច្រើនទេ។ គេធ្វើការកាត់ផ្លែផ្នែកខាងលើចោល ដោយរក្សាទុកផ្លែត្រឹមចំនួនសមស្រប (ផ្លែដែលមានជម្ងឺ និងរងសត្វល្អិត បំផ្លាញមិនប្រមូលឡើយ)។ ពេលផ្លែម្តេសទុំពិតប្រាកដ តាមអាយុកាលវា គេបេះផ្លែម្តេសយកមករក្សាទុកចំនួន ២-៣ថ្ងៃ នៅក្នុងជំរកត្រជាក់ ហើយបន្ទាប់មកទៀតទើបរះយកគ្រាប់ ទៅត្រាំទឹករយៈពេល ១០-១២ម៉ោង រួចទើបយកមកលាង ទឹកសំអាតគ្រាប់ពូជ និងដាក់ហាលថ្ងៃឱ្យស្ងួតរយៈពេល ១-២ថ្ងៃ ទើបគេយកទៅរក្សាទុកនៅកន្លែងស្ងួត។